

virtuais.

beste online casino :casa de aposta da copa

Grupos de agricultura frequentemente alegam que a quantidade geral de pesticidas aplicados às terras do Reino Unido foi reduzida à metade desde 1990. Isso é verdade, mas os tipos de pesticidas utilizados estão se tornando mais tóxicos, com mais produtos químicos nocivos aumentando o uso e a área de terra tratada com pesticidas também aumentando.

Também não temos uma imagem completa do uso de pesticidas no Reino Unido; diferentemente dos países europeus, incluindo a Irlanda, o país não tem dados de vendas obrigatórios, portanto, não pode dizer quanto está sendo vendido para empresas agrícolas.

Toxicidade crescente

Desde a criação na década de 1940, a toxicidade dos pesticidas aumentou significativamente. Alguns argumentam que isso é bom, porque significa que menos precisa ser usado e pode atingir certas espécies em vez de ser aplicado em uma área de cultura inteira. No entanto, isso também significa que produtos químicos altamente tóxicos estão sendo aplicados amplamente no Reino Unido e matando insetos e outras formas de vida. Isso também significa que humanos e vida selvagem não estão necessariamente menos expostos à toxicidade do que quando uma maior quantidade de pesticidas menos tóxicos estava sendo aplicada.

Aumento do uso de pesticidas perigosos

Embora as quantidades gerais de pesticidas tenham diminuído, houve aumentos no uso de pesticidas altamente perigosos. Os PQPs são produtos químicos que são reconhecidos por apresentarem níveis particularmente altos de riscos agudos ou crônicos para a saúde ou o meio ambiente, de acordo com sistemas de classificação internacionais aceitos, como a Organização Mundial da Saúde. Esses incluem:

Glifosato

Cem e quinze produtos contendo glifosato são aprovados para uso profissional. Esse poderoso herbicida é altamente tóxico para abelhas e organismos aquáticos, além de ser um probabilidade de carcinógeno humano. O uso entre 2020 e 2024 aumentou, em termos de peso usado, terra tratada e taxa de aplicação por hectare. O peso de glifosato aplicado à terra do Reino Unido aumentou em 16% nesses quatro anos, e a porcentagem de área pulverizada aumentou em 9%.

Ciantaniliprole

Três produtos contendo esse inseticida tóxico são aprovados para uso profissional. É altamente tóxico para abelhas e é usado em uma variedade de plantas vegetais, incluindo brócolis, couves, repolho e cenouras. É usado para combater uma variedade de pragas, incluindo afídeos, mosca branca e trips. A mudança percentual de peso desse pesticida aumentou 241% entre 2023 e 2024. A mudança percentual de área tratada com esse químico aumentou 345% nesse período de tempo.

2,4-D

Esse herbicida hormonal é amplamente utilizado no mundo devido à sua eficácia no controle de plantas broadas e lenhosas. As ervas daninhas incluem chickweed, clover, dandelion, wild geranium, ivy, milkweed, plantain, e thistle. Setenta e cinco produtos contendo esse herbicida são aprovados para uso profissional. É tóxico a minhocas, espécies aquáticas e abelhas, é cancerígeno para humanos e suspeito de ser um disruptor endócrino. O herbicida é usado em uma variedade de culturas aráveis e a quantidade de herbicida usada desse herbicida aumentou 117% entre 2023 e 2024. A mudança percentual de área nesse período de tempo aumentou 67%.

Imazalil

Esse fungicida foi encontrado como carcinogênico e cinco produtos que o contêm são aprovados para uso profissional. É usado em cevada, trigo e batatas para proteger suas sementes e batatas armazenadas de infecções fúngicas. Há longa discussão na UE sobre banir

Author: fauna.vet.br

Subject: beste online casino

Keywords: beste online casino

Update: 2024/6/29 20:44:15